



C E N T R O  
HOSPITALAR  
L E I R I A

## Protocolo Para C.P.R.E.

### SERVIÇO DE GASTROENTEROLOGIA

A CPRE é realizada no Serviço de Imagiologia após marcação prévia pelo Serviço de gastroenterologia.

É necessário:

- ❖ **Consentimento por escrito do doente, após explicação do exame;**
- ❖ Se o doente é portador de um PACEMAKER deve fazer-se acompanhar de um parecer do cardiologista sobre este procedimento (durante a esfínterectomia utilizamos corrente diatermica);
- ❖ Excluir história de alergia a produtos iodados, de coagulopatia ou de medicação que interfira com a coagulação (dicumarínicos, antiagregantes plaquetares, AAS, AINEs, etc.) que deverá ser suspensa, se possível, 8 dias antes;
- ❖ Que o doente se abstenha de qualquer alimento a partir do jantar da véspera e que tome 1 comprimido de 10 mg de diazepam na noite que precede o exame;
- ❖ Quando o doente for chamado para o exame, deve iniciar perfusão 1gr. de paracetamol;
- ❖ O doente deverá ser transportado em maca, vir punccionado no membro superior esquerdo e fazer-se acompanhar de:
  - Processo clínico - onde deverá constar hemograma e protrombinémia recentes, história de reacções alérgicas e de medicação “anti-coagulante”
  - Uma ampola de PETIDINA
  - Uma ampola MIDAZOLAN
  - Uma ampola BUSCOPAN
  - Uma ampola GLICAGINA
  - Uma ampola UROMIRON
- ❖ Após exame o doente deve permanecer em pausa alimentar com soro glicosado para manter a veia até ao dia seguinte; deverá ser feita vigilância dos parâmetros vitais e temperatura e realizar AMILASÉMIA 6 a 8 horas após realização do exame. Se alterações clínicas ou laboratoriais deverá ser contactado o médico de serviço.